

# FEC100 療法施行時の飲み薬について

小山記念病院 化学療法委員会

## ◆◆ FEC100 に使用する支持療法薬（副作用を予防するための薬） ◆◆

イメンドカプセル 125mg、80mg      デカドロン錠 4mg

パリエット錠 10mg                      リーゼ錠 5mg

## ◆◆ それぞれの薬の内服方法は？ ◆◆

【イメンドカプセル】吐き気止めとして使用します。

点滴当日を1日目として、3日目まで内服を続けます。

1日目は125mgカプセル、2日目と3日目は80mgカプセルを内服します。

※ 1日目は点滴開始1時間前に、2日目は午前中（朝食後等）に服用

【デカドロン錠】吐き気止めとして使用します。

点滴翌日から内服を開始します。

【パリエット錠】胃酸の分泌を抑え、胸焼け症状を予防します。

点滴翌日から内服を開始します。

【リーゼ錠】気持ちを落ち着かせる効果があります。

点滴当日の夕食後から内服を開始します。



## ◆◆ 注意点 ◆◆

イメンドカプセルは次回点滴時に服用する分を事前に処方しています。

保険薬局等で薬をもらった後、点滴当日まで内服せずに保管し、当日病院へ持参してください。

## ◆◆ 飲み方がわからなくなったら／飲み合わせが気になったら ◆◆

飲み方がわからなくなってしまった時には病院や保険薬局にお問い合わせください。

普段服用している薬との飲み合わせが気になった際には、薬剤師にお問い合わせください。

医療法人社団善仁会小山記念病院

Tel 0299(85)1111 (代表)